

La piroplasmose

QU'EST-CE QUE C'EST ?




La piroplasmose est une maladie transmise au chien par les **tiques**. Ces dernières sont très présentes sur les chemins de campagne. On les rencontre beaucoup dans les sous-bois, les broussailles...

Elles se fixent volontiers sur la peau de votre chien au cours d'une promenade.

48 heures après fixation sur la peau du chien, la tique peut lui inoculer un parasite appelé « piroplasma » qui va se loger dans les **globules rouges** de l'animal et les faire éclater.

Le chien présente alors rapidement une **anémie**.

La maladie est présente sur tout le territoire français, avec une prévalence particulièrement forte dans le Sud-Ouest et sur le pourtour du Massif Central.



QUELS SONT LES SYMPTOMES ?

Le chien souffrant de piroplasmose a les muqueuses pâles car il est anémié : Si vous soulevez ses babines, vous remarquerez que ses gencives et son palais ont perdu leur coloration rose et sont anormalement blancs.



L'animal est abattu, mange peu. Il présente de la fièvre et des urines foncées (couleur **marc de café**).

Peuvent s'ensuivre des complications au niveau rénal et hépatique notamment.

EST-CE QUE LA PIROPLASMOSE PEUT TOUCHER LE CHAT ? L'HOMME ?

Le chat est rarement touché mais quelques cas ont été décrits.

L'homme piqué par une tique ne peut pas être atteint de piroplasmose. En revanche, les tiques peuvent lui transmettre d'autres maladies graves, en particulier la maladie de Lyme !

EST-CE QUE CETTE MALADIE SE SOIGNE ?

C'est une maladie qui se soigne mais il faut **agir vite**. Si elle n'est pas prise à temps, elle est rapidement mortelle.



Pour confirmer la maladie, le vétérinaire prélèvera un peu de sang à votre animal et l'observera au microscope. En cas de piroplasmose, il peut visualiser les parasites au sein des globules rouges.

Si votre chien est atteint, le vétérinaire lui administrera un traitement par injection permettant de tuer les piroplasmose.

Selon la gravité de l'état de santé de l'animal, une hospitalisation peut être nécessaire. Le chien sera alors placé sous perfusion.

Si l'anémie est sévère, une transfusion sanguine sera effectuée.

QUE FAIRE POUR L'ÉVITER ?

Il existe deux moyens de prévention principaux.

Le premier est le **vaccin**. Le chien doit recevoir 2 injections vaccinales la première année, puis un rappel chaque année.

Bien que très efficace, le vaccin ne protège pas à 100% contre la piroplasmose.

D'où la nécessité d'utiliser en complément un **antiparasitaire externe** (sous forme de pipette, collier, comprimé, ou spray) efficace contre les tiques.

Le fait de combiner ces deux moyens de protection vous permettra de vous promener en toute sérénité avec votre chien.

Demandez conseil à votre vétérinaire : il vous conseillera sur le protocole le mieux adapté pour votre animal.

Pensez aussi à bien papouiller votre chien **au retour de promenade** : si vous décelez une tique fixée sur sa peau, vous pouvez ainsi la retirer avec un crochet tire tique et **surveiller** l'absence d'apparition de symptômes **dans les 10 jours qui suivent la piqûre**.



Sachez qu'il faut protéger votre chien contre les tiques toute l'année. On pense à tort que les tiques ne sont présentes qu'au printemps et en automne. On en trouve en réalité **durant toutes les saisons !**