

MON LAPIN NE MANGE PLUS

CONDUITE A TENIR EN URGENCE :

Forcer votre lapin à boire : cela permet d'une part de réhydrater l'animal et d'autre part d'humidifier le contenu de l'estomac facilitant ainsi sa vidange notamment dans les cas de stase. Proposez-lui de l'eau ou du jus de fruit. S'il ne veut pas boire, forcez-le par le biais d'une petite seringue.



Faire des massages abdominaux : une anorexie prolongée peut rapidement évoluer vers un arrêt de transit et un iléus. Ces coliques sont particulièrement douloureuses. Des massages permettent à la fois de soulager momentanément la douleur et de maintenir une certaine motilité intestinale.

Maintenir votre lapin au chaud : lorsque l'anorexie est prolongée et/ou que l'animal est en choc, sa température corporelle diminue rapidement. L'hypothermie participe à l'entretien de l'état de choc. Installez votre lapin au milieu de serviettes ou de couvertures et protégez-le des courants d'air. Vous pouvez également installer une bouillote près de lui en veillant à la recouvrir d'un linge pour ne pas brûler votre animal. Si vous avez un thermomètre, vous pouvez vérifier la température.

GRAVITÉ :

L'urgence vétérinaire dépend de l'état général et du transit de votre lapin. Lorsqu'ils sont conservés, la consultation peut être différée de quelques heures. Si l'état général du lapin se dégrade, une consultation en urgences est nécessaire pour son pronostic vital. Tout arrêt du transit chez le lapin de plus de 24 heures met en jeu sa vie. En cas d'arrêt ou de ralentissement du transit, il est indispensable de consulter rapidement (dans les 24 heures).

PRINCIPALES CAUSES POSSIBLES :

Causes digestives : malocclusion dentaire, stase digestive, corps étranger digestif (trichobézoard = boules de poils), dysbiose bactérienne, entérotoxémie consécutive à l'administration d'antibiotiques non-adaptés à l'espèce.

Causes extra-digestives : maladie systémique (insuffisance rénale/hépatique/cardiaque, processus infectieux, néoplasie), stress, douleur (calcul urinaire, fracture...).

QUEL VÉTÉRINAIRE CONTACTER ?

La prise en charge des cas d'anorexie ayant une répercussion importante sur l'état général, elle est difficile à domicile. De plus, les examens complémentaires nécessaires au diagnostic ne sont généralement pas réalisables sur place et nécessite du matériel disponible uniquement dans une clinique vétérinaire.

En conséquence : si votre vétérinaire traitant est ouvert, c'est bien évidemment l'interlocuteur privilégié. En son absence, la nuit, les week-ends, pour ce type d'urgence, une consultation sans délai dans un service d'urgence est indispensable. En effet, une surveillance vétérinaire prolongée doit être mise en place, un traitement de l'état de choc, la mise en place d'une réalimentation forcée et des examens complémentaires (radiographies, analyses de sang...) sont nécessaires. Afin de connaître la clinique d'urgences la plus près, il faut téléphoner à votre vétérinaire traitant.

HOSPITALISATION :

L'hospitalisation est souvent nécessaire et même indispensable dans les cas graves. Selon la situation, une radiographie et des analyses sanguines permettront de localiser l'origine de l'anorexie et de fournir un pronostic. Cependant l'urgence principale est de gérer l'état de choc et de mettre en place des perfusions adaptées, de garder l'animal au chaud et de le réalimenter. Une fois l'animal stabilisé, d'éventuels examens ou traitements plus invasifs peuvent être envisagés.

